

Drosera peltata

DIONÉE

ASSOCIATION FRANCOPHONE
DES AMATEURS DE
PLANTES CARNIVORES

Mairie de Lyon
Jardin Botanique
69205 Lyon Cedex 01
www.dionee.org
contact@dionee.org



Photo Serge Lavyssière

Conseils de culture de *Drosera peltata*

Habitat naturel : Est Australien, Chine du Sud, Inde, Japon et tout le S.E. Asiatique. On le trouve en général à l'abri des plantes plus grandes. *Drosera peltata* pousse pendant les 6 mois d'hiver humide, avec des températures s'échelonnant de 2 à 26°C., et disparaît pendant l'été chaud et sec où les températures peuvent atteindre 40°C. Comme la majorité des plantes carnivores, *Drosera peltata* croit en des lieux où l'on trouve une très grande humidité (saisonnier) et des sols très pauvres et acides.

Taille : cette plante croît rapidement en début de période de pousse. La tige peut dépasser parfois les 25 cm en hauteur.

Plantation : pot en plastique de préférence, de 20 cm de diamètre et de 15 cm minimum en hauteur.

Substrat : tourbe blonde et sable non calcaire en proportions égales. Certains cultivateurs utilisent jusqu'à 80 % de sable.

Substrat alternatif (sans tourbe) : on attend vos suggestions !

Lumière : semi-ombragé.

Températures : ne pas dépasser 25 °C pendant la période de végétation.

Hygrométrie : 70 %. À cultiver de préférence en terrarium ou sous cloche.

Arrosage : il faut avant tout connaître l'origine des plantes. Si elles proviennent d'Australie, il faut tenir compte du fait que les saisons sont inversées par rapport à l'hémisphère nord. Pendant la période de pousse (de février à la fin de l'été, qui correspond plus ou moins à l'hiver en Australie), mettre le pot dans une soucoupe remplie d'1 cm d'eau distillée ou d'eau de pluie. Dès que la plante se fane, cesser impérativement l'arrosage et laisser sécher le substrat dans un endroit frais et humide jusqu'à la reprise.

Période de repos estival : contrairement à une grande majorité de plantes carnivores, la période de repos est l'été (qui correspond à notre hiver). Si la plante est réglée sur l'hémisphère nord, la période de repos est plutôt entre avril et juin. En repos, ne jamais laisser le pot en plein soleil. Dès que le compost est bien sec, récupérer les tubercules. Les conserver après pulvérisation de fongicide dans de petites boîtes hermétiques (pellicules photos) pleines de *Sphagnum* bien sec, à la température de la pièce. Surveiller périodiquement leur état, désinfecter d'éventuelles moisissures par rinçage et humidifier légèrement si les tubercules semblent se flétrir.

Gestion des tubercules : les planter fin août à 3 cm de profondeur, la cicatrice laissée par la racine pointée vers le haut. Humidifier avec parcimonie jusqu'à apparition de la pousse, puis arrosage normal.

Reproduction : par graines, par bouture de tige, par de nouveaux tubercules.

Conseils pour le semis de *Drosera peltata*

Substrat : directement dans le pot définitif ou sur lit de sphaigne hachée.

Saison : à partir d'août et en automne.

Réalisation : les graines ne germent pas facilement. Il est conseillé de les ébouillanter avant de les semer sur la surface du substrat.

Du semis à l'âge adulte : environ 9 mois : formation des rosettes jusqu'en janvier, puis apparition des tiges.

Remarques : *Drosera peltata* fait partie du groupe difficile des *Drosera* tubéreux mais au sein de ce groupe est une très bonne espèce pour débiter, sa difficulté de culture étant très relative.

Cultures similaires : *D. auriculata*, *D. machranta*, *D. whittakeri*.

En savoir plus

Dionée No. 15 : *Drosera peltata* (Serge Lavyssière).

www.forumcarnivore.org/ftopic7665.php : L'INDEX - *Drosera* australiens du Forum carnivore

The Savage Garden de Peter D'Amato

Glistening Carnivores de Stewart Mac Pherson